

【感根処置に関するもの】

(主訴) 6 の咬合時の疼痛

(病名) 6 C₃ 慢化 per、歯肉息肉

月日	部 位	療 法 ・ 処 置	点 数	負担金 徴収金	コメント
7/1	— —	か初診(か初診に関するコメント 略)	270		
	— 6	X ray(D) 1 F 根尖部に透過像	48		
	— —	OA(ハリケーンゲル) 2%キシロカイン CT1.8ml 浸麻	/		
	— —	歯肉息肉除去(歯冠崩壊し内部に息肉)	55		注 1
	— 6	感根処(NC FC EZ)	370		
	— —	EMR(MB 16.0mm #30、DB 16.0mm #35)	60		
	— —	(P 20.0mm #40)	/	803 2410	
7/5	— —	か再診	40		
	— 6	咬合痛(-) 発泡(+)	/		
	— 6	ラバー RCT(NC FC EZ)	10+21	71 210	
7/11	— —	か再診	40		
	— —	咬合痛(+)	/		
	— 6	ラバー RCT(NC FC EZ)	10+21		
	— —	根管形成 MB #35、DB #40、P #50	/	71 210	
7/15	— —	か再診	40		
	— —	発泡(-) 打診痛(-) 咬合痛(-) ラバー	10		
	— 6	根充 CRF(G.ポイント CAN)	10+150		
	— —	X-Ray 1 F(D) 根充状態 良好	38	348 1040	
	— —	7月分 実 4 日 1293 点			
	— —				
	— —				
	— —				
	— —	注 1 : 感根処時は 55 点、抜髄時は 110 点			



【抜髄に関するもの】

(主訴) 2～3日前につめた物が取れた。昨日から痛みがあり眠れない

(病名) 6 C₃ 急化 pul

月日	部 位	療 法 ・ 処 置	点 数	負担金 徴収金	コメント
7/1	— —	か初診(か初診に関するコメント 略)	270		
	— 6	X - Ray(D) 1 F	48		
	— —	ア充一部残留、咬合面から遠心にかけて齶窩大			
	— 6	冷水痛(+) 温水痛(+) 自発痛(+)			
	— —	OA(ハリケーンゲル) 2%キシロカイン CT1.8ml 浸麻			
	— —	ア充除去 ラバー 抜髄(NC メトコール EZ)	15 + 10 + 530		
	— —	EMR (MB 18mm #30、DB 19.0mm #35 P 23.0mm #40)	60	933 2800	
7/6	— —	か再診	40		
	— 6	自発痛(-) 術後2～3日 咬合痛あったが現在は			
	— —	咬合痛(-)			
	— 6	ラバー RCT(NC メトコール EZ)	10 + 21		
	— —	根管形成 MB #40 DB #40 P #50		71 210	
7/11	— —	か再診	40		
	— —	自発痛(-) 打診痛(-)			
	— 6	ラバー 根充	10 + 110		
	— —	CRF(G.ポイント CAN)	150		
	— —	X-Ray(D) 1 F 根充良好	38	348 1040	
	— —	7月分 実 3 日 1352 点			
	— —				
	— —				
	— —				



【抜歯に関するもの】

(主訴) 5| 根尖部圧痛

(病名) 5| C₃ 慢性 per

月日	部 位	療 法 ・ 処 置	点 数	負担金 徴収金	コメント
7/1	— —	か初診	270		
	5 —	X-Ray(D) 1 F 5 根尖部にX線透過像の病巣を認め、	48		
	— —	歯肉縁下への歯質崩壊が激しい為、保存不能と判断			
	— —	抜歯を予定			
	— —	病態模型にて治療計画等を説明、患者 同意			
	— —	治療計画書にて情報提供			
	— —	OA(ハリケーンゲル) 2%キシロカインC T1.8ml 浸麻			
	5 —	抜歯 縫合2系	260		
	— —	Rp)ケフラルカプセル 250mg 3 C × 3日分 (内服)	20 × 3		
	— —	ボルタレン錠 2 T × 2回分 (疼痛時)	3 × 2		
	— —	① + ②	42 + 9		
	— —	③ 効能と副作用について説明	10	705 2120	
7/3	— —	か再診	40		
	5 —	S p(H ₂ O ₂ 、J G) 出血(-) 腫脹(±) 疼痛(-)		40 120	
7/10	— —	か再診	40		
	5 —	S p(H ₂ O ₂ 、J G) 抜糸			
	— —	経過良好 疼痛(-)		40 120	
	— —	7月分 実 3 日 785 点			
	— —	難抜歯 とは、歯根肥大、骨の癒着歯等に対して骨の開削			
	— —	または歯根分離術等を行った場合をいう。高血圧等の全			
	— —	身状態との関連から、単に抜歯にあたり注意を要する抜			
	— —	歯については、「難抜歯」に含まない。			

