

【根切・WZ摘出術】

(主訴) 鼻の下が腫れて痛い (病名) 1] per、WZ

月日	部 位	療 法 ・ 処 置	点 数	負担金 徴収金	コメント
4/1	— —	か初診(内容省略)	270		
	— —	1] 根尖部圧痛 (+)	/		
	1 —	X - Ray (D) 1 F	48		
	1 —	根尖部に境界明瞭な歯冠大の透過像を認める	/	318 950	
4/8	— —	か再診	40		
	— —	0A 2 %キシロカイン C t 1.8ml 浸麻	/		
	1 —	3 + 1 切開 粘膜骨膜弁剥離	1300		
	1 —	歯根端切除手術 1] 根尖部骨削除、逆根充(ア充)	770		注
	— —	WZ摘出手術(歯冠大)	/		
	— —	根尖切除 WZ摘出	/		
	— —	5針 縫合	/		
	— —	ケフラールカプセル 250mg 3 C } 分3、毎食後	28 × 3		
	— —	ロキソニン錠 60mg 3 T } 3日分	/		
	— —	㊦ + ㊧	42 + 9		
	— —	薬剤情報提供料(略)	10	2255 6770	
4/9	— —	か再診	40		
	— —	S p (H 2 O 2、 J) 腫脹 (+) 疼痛 (+)	/	40 120	
4/15	— —	か再診	40		
	— —	S p (H 2 O 2、 J) 抜糸	/		
	— —	創部治癒経過良好	/	40 120	
	— —	4月分 実4日 2,653 点			
	— —				



【歯牙再植術】

(主訴) 前歯をぶつけて歯が取れそう (病名) 1) 外傷性歯牙脱臼

月日	部 位	療 法 ・ 処 置	点 数	負担金 徴収金	コメント
4/4	— —	初診	180		
	— —	20分ほど前に自転車転倒により上顎前歯部強打し、	/		
	— —	歯根破折(-) 1) 部出血、挺出、動揺			
	1 —	X-Ray(D) 1F	48		
	— —	1) 唇側に傾斜し、脱臼	/		
	— —	0A2%キシロカインC t1.8ml 浸麻	/		
	1 —	歯牙再植術	1300		①注 1
	321 12	T-Fix	530		①注 2
	— —	ワイヤー結紮+スーパーボンド	22×5		
	— —	X線(D) 1F 再植状態確認	38		
	— —	ヤマシリンカプセル 250mg 3C } 分3、毎食後	16×3		
	— —	ロキソニン錠 60mg 3T } 3日分	/		
	— —	①処 + ①調	42+9		
	— —	薬剤情報提供料(略)	10	2315 6950	
4/5	— —	再診	38		
	1 —	Sp(H ₂ O ₂ 、J)	/		
	321 12	固定状態 良好 自発痛(-) 発赤(+)、腫脹(±)	/	38 110	
4/10	— —	再診	38		
	1 —	Sp(H ₂ O ₂ 、J)	/		
	— —	経過良好	/	38 110	
	— —	4月分 実3日 2,391点			

【調B・調A・調D ・床リソウ】

(主訴) 4月: 下の入れ歯が割れた (病名) 7⇨7 義歯破損 7⇨7 MT
 上の歯が揺れて咬めない (病名) 3|4 P₃ 7⇨7 MT
 (主訴) 11月: 上の義歯がゆるい感じがする。 (病名) 7⇨7 MT(長調)
 下の入れ歯があたる (病名) 7⇨7 MT(リソウ)

H
15

月日	部 位	療 法 ・ 処 置	点 数	負担金 徴収金	コメント
4/1	— —	か初診 (内容 省略)	270		
	— —	(所見)上下顎の義歯 古く不適合 3 4 動揺大きい			
	3 4	X - Ray (D) 2 F	48 × 2		
	— —	歯槽骨吸収 著明、保存不可			
	7 7	修理 単 Imp	40		
	— —	B T	255		
	— —	長時間待機			
	7 7	床修理	400		
	— —	破損部ユニファースト にて接合			
	— —	調 B	30		①注 1
	— —	年齢的変化による顎骨の吸収並びに唾液の減少について説明した。			
	— —	作業用模型 Imp		1091 3270	
4/8	— —	か再診	40		
	— —	補診	70 + 30		
	— —	旧義歯不適合の為 新製			
	— —	下顎顎底の吸収高度			
	— —	3 4 保存不可、7⇨7 即時義歯予定			
	7 7 7 7	連 Imp (個人トレー + シリコン)	225 × 2	590 1770	
4/12	— —	か再診	40		
	7 7 7 7	B T (咬合床、オストロン + ワックス)	255 × 2	550 1650	



【調B・調A・調D ・床リソウ】

月日	部 位	療 法 ・ 処 置	点 数	負担金 徴収金	コメント
4/20	— —	か再診	40		
	7 7 7 7	T F	190 × 2		
	— —	上顎は3 4部を除いた状態で試適	/		
	— —	人工歯形態、咬合 良好	/	420 1260	
4/27	— —	か再診	40		
	3 4	OA 2 %キシロカイン C t 1.8ml 浸麻	/		
	3 4	T -Ext	150+260		
	— —	ケフラルカプセル 250mg 3 C × 2 日分 分3 毎食後	20 × 2		
	— —	ボルタレン錠 25mg 2 T × 2 回分 疼痛時	3 × 2		
	— —	㊦ + ㊧	42 + 9		
	— —	薬剤情報提供料(内容略)	10		
	7 7 7 7	レジン床総義歯 set (7+7 即時義歯)	2258 × 2		
	— —	レジン歯	(27 + 30) × 2		
	— —	調A	65		
	— —	新しい義歯であり、抜歯後でもあるので、かみ易い物	/		
	— —	から徐々に慣れるように	/	5252 15760	
	— —	4月分 実5日 7,903 点			
5/1	— —	か再診	40		
	3 4	Sp(H 2 O 2)	/		
	— —	創部治癒経過良好	/		
	7 7 7 7	調A	65		
	— —	左下臼歯床縁部粘膜発赤、削合調整	/		
	— —	夜間保存法説明	/	105 320	



【調B・調A・調D ・床リソウ】

月日	部 位	療 法 ・ 処 置	点 数	負担金 徴収金	コメント
5/7	— —	か再診	40		
	$\frac{7}{7}$ $\frac{7}{7}$	調A	40		
	— —	あたる所もなく、以前よりよく噛める			
	— —	義歯の清掃法 指導		420 1260	
	— —	5月分 実2日 185 点			
H 15	— —	上の義歯がゆるい感じがする。下の入れ歯があたる			
11/5	— —	か初診 (内容省略)	270		
	$\frac{7}{7}$ $\frac{7}{7}$	フィットテスト			
	— —	上顎義歯 3 4部を中心に適合不良			
	— —	下顎義歯 左側不適			
	$\frac{7}{7}$ $\frac{7}{7}$	調D	300		
	— —	下顎左側床縁部削合			
	— —	咬合機能回復難度加算	200		③注
	— —	咬合確認			
	— —	義歯清掃法 指導		770 2310	
11/15	— —	か再診	40		
	— —	補診 (口腔内直接床裏装) 7+7	70		
	$\frac{7}{7}$ $\frac{7}{7}$	床裏装	800		④注
	— —	床縁確認		910 2730	
11/24	— —	か再診	40		
	— —	7 6部 DuI 床縁削合			
	— —	咬合接触調整		40 120	
	— —	11月分 実3日 1,720 点			



【調B・調A・調D ・床リソウ】

月日	部 位	療 法 ・ 処 置	点 数	負担金 徴収金	コメント
12/1	— —	か再診	40		
	7 7	調B	30		
	— —	Dul 改善し 良好			
	— —	義歯の取り扱い、清掃を再度確認		70 210	
	— —	12月分 実1日 70点			
	— —				
	— —	・有床義歯調整指導には下記の4項目があり、いずれ			
	— —	も1口腔単位として算定する。			
	— —	新製義歯調整指導料〔調A〕			
	— —	有床義歯調整・指導料〔調B〕			
	— —	有床義歯長期調整指導料()〔調D 〕			
	— —	有床義歯長期調整指導料()〔調D 〕			
	— —	①			
	— —	・有床義歯の新製前に旧義歯の修理等を行った場合、			
	— —	その時点では調Bを算定し、新製後に調Aを算定で			
	— —	きる。			
	— —	・T・コンデを行い、有床義歯の新製又は床裏装を予			
	— —	定している場合は、いずれの義歯調整指導料も算定			
	— —	できない。			
	— —	②			
	— —	【調D (長調)】			
	— —	・有床義歯の装着の日を含む月から起算して6月を越			

【調B・調A・調D ・床リソウ】

月日	部 位	療 法 ・ 処 置	点 数	負担金 徴収金	コメント
	— —	え1年以内の期間において検査をし、調整かつ指導			
	— —	を行った場合に期間中1回に限り算定する。			
	— —	・調D を算定した月の調Bは算定できない。			
	— —	・自院にて製作した義歯が対象である。			
	— —	・調D を算定した月と翌月の有床義歯の新製に係る			
	— —	費用は算定できない。			
	— —	・調D を算定した月の翌月の床裏装に係る費用は算			
	— —	定できない。			
	— —	・調D を算定した月と同一月に行った床裏装は所定			
	— —	点数の80/100に相当する点数により算定する。			
	— —	③【咬合機能回復難度加算】			
	— —	総義歯を装着した患者、又は9歯以上の局部義歯を			
	— —	装着し、かつ、当該局部義歯以外に対合歯間の接触関			
	— —	係を有しない患者に対して行った場合は、咬合機能回			
	— —	復難度加算200点を加算する。			
	— —	【調D（長調）】			
	— —	調D を算定した患者に対して、当該算定を行った月			
	— —	から6月を越え1年以内の期間において、検査、調整、			
	— —	指導を行った場合に期間中1回に限り算定する。			
	— —				
	— —				
	— —				